


DARE TO BE AWARE <<<

Hiv-indicatoraandoeningen

Hiv-indicatoraandoeningen zijn aandoeningen of symptomen die vaker voorkomen bij mensen met een onderliggende hiv-infectie.

Hiv-indicatoraandoeningen zijn onder te verdelen in twee groepen:



Verminderde afweer

Hiv-indicatoraandoeningen kunnen tot uiting komen als de afweer verminderd is. Dit is kenmerkend voor een langer bestaande hiv-infectie.

Bijvoorbeeld: baarmoeder- halskanker, gordelroos of een terugkerende longontsteking.



Dezelfde overdrachtsroute

Hiv-indicatoraandoeningen kunnen, net als hiv, via seksueel contact, bloed-bloed contact of van moeder op kind worden overgedragen.

Bijvoorbeeld: soa's of hepatitis B en C.

Mensen met een hiv-diagnose in Nederland

cijfers eind 2022 volgens Stichting hiv Monitoring



17.595
Mannen in zorg

80%



4.120
Vrouwen in zorg

19%



272
Transpersonen in zorg

1%




1.390 (naar schatting)
Mensen unaware
van hun onderliggende hiv infectie

?

?

?

393 nieuwe hiv-diagnoses in Nederland waarvan:



waarvan 47%
'Late presenters'



waarvan 31%
50 jaar of ouder
ten tijde van
hiv-diagnose

>>> Heb jij een hiv-indicatoraandoening? Laat je dan altijd testen op hiv! <<<

niet meetbaar

N=N

niet overdraagbaar

Door adequate behandeling van hiv wordt de overdracht 100% voorkomen.

DE WERELD AIDSVRIJ IN 2030

Het standaard inzetten van hiv-screening bij hiv-indicatoraandoeningen, ongeacht leeftijd, afkomst en seksuele voorkeur **vermindert** de stigmatisering rondom hiv en **optimaliseert** de gezondheidszorg.

